



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA)
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
DISCIPLINA: MATA02 - CÁLCULO A

UNIDADE I - LISTA DE EXERCÍCIOS

Matemática básica

(1) Calcule a média aritmética, o $m.m.c.$ e o $m.d.c.$ dos números 36, 40 e 56.

(2) Qual é a metade de 2^{2026} ?

(3) Verdadeiro ou falso? Justifique!

(a) $2^3 + 2^2 = 2^5$	(d) $\sqrt[3]{\sqrt[4]{7}} = \sqrt[7]{7}$	(g) $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$
(b) $(4^3)^2 \neq 4^9$	(e) $\sqrt{\sqrt{10}} = \sqrt[4]{10}$	(h) $(a-b)^2 = a^2 - b^2$
(c) $(4^3)^2 = (4^2)^3$	(f) $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	(i) $\frac{a}{a+b} = \frac{a}{a} + \frac{a}{b}$.

(4) Simplifique as seguintes expressões numéricas:

(a) $\left[2^9 \div (2^2 \cdot 2)^3\right]^{-3} \cdot (0,2)^2$	(g) $\sqrt{1+\sqrt{5}} \cdot \sqrt{\sqrt{5}-1}$
(b) $\frac{6 \cdot 10^{-3} \cdot 3 \cdot 10^{-4} \cdot 10^8}{6 \cdot 10^{-1} \cdot 10^4}$	(h) $(x-y)^2 - (x+y)^2$
(c) $\sqrt[3]{8^{-2}} + \sqrt{9}$	(i) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} - \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} + \left(-\frac{1}{4}\right)^{-2}$
(d) $\sqrt{8} - \sqrt{18} + 2\sqrt{2}$	(j) $16^{0,5} + 8^{-\frac{1}{3}} + \left(\frac{1}{32}\right)^{-0,2} - (0,25)^2$
(e) $\frac{a^{-1/9} \cdot (a^{-1/3})^2}{-a^2} \div \left(-\frac{1}{a}\right)^2$, para $a \neq 0$	(k) $1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}}$.
(f) $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 + \frac{1}{5+2\sqrt{6}}$	

(5) Resolva as seguintes equações:

(a) $2 - 5x = 17$	(f) $\frac{2(x+1)}{3} - \frac{3(x+2)}{4} = \frac{x+1}{6}$
(b) $\frac{2 - 1/3}{1 + 1/4} = \frac{x}{1 + 2/5}$	(g) $(4x-3)(x+1) = 0$
(c) $x^2 - 10x + 25 = 0$	
(d) $1 - \frac{1}{1-x} = \frac{1}{1-x}$	(h) $\frac{\frac{1}{x} - \left(\frac{1}{6x} - \frac{1}{3x}\right)}{\left(\frac{1}{6x} + \frac{1}{2x}\right)^2 + \frac{3}{2x}} = 1.$
(e) $\frac{2 - 3x}{x+2} = 0$	

(6) Resolva as seguintes equações:

(a) $-2x^2 + 3x + 3 = -2$

(c) $x^4 - 8x^2 + 16 = 0$

(b) $(x-1)(1+x)(4-2x) = 0$

(d) $70 = \frac{x}{1,2} + \frac{3x}{(1,2)^2}$.

(7) Verifique as seguintes identidades:

(a) $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

(c) $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

(b) $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

(d) $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$.

(8) Encontre a solução dos seguintes sistemas de equações:

(a) $\begin{cases} x - y = 2 \\ 2x + y = 1 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} 3x + y = 1 \\ 2x + 2y = 1 \end{cases}$.

(9) Simplifique as expressões:

$$(a) \frac{a+b}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \quad (b) \frac{a^2 + 2ab + b^2}{a^2 - b^2} \div \frac{a-b}{a+b} \quad (c) \frac{\frac{m}{m+n} + \frac{n}{m-n}}{\left(\frac{n}{m+n} - \frac{m}{m-n}\right)} + \frac{1 + \frac{m}{n}}{1 + \frac{(m-n)^2}{4mn}} \cdot \left(1 + \frac{n}{m}\right).$$

(10) O que está errado na seguinte demonstração?

$$\begin{aligned} \text{Seja } x = y &\implies x^2 = xy \implies x^2 - y^2 = xy - y^2 \\ &\implies (x+y)(x-y) = y(x-y) \\ &\implies x+y = y \\ &\implies 2y = y \implies 2 = 1. \end{aligned}$$

(11) A equação polinomial $x(x^2 + 4)(x^2 - x - 6) = 0$ possui quantas raízes reais?

(12) Resolva as seguintes equações: (a) $x+2 = \sqrt{9x-2}$ (b) $x-6 = \sqrt{x}$.

(13) Determine $x \in \mathbb{N}$ que satisfaz a equação $x = \sqrt{7+4\sqrt{3}} + \sqrt{7-4\sqrt{3}}$.

(14) Passeando por um sebo, você encontrou um livro de Cálculo pelo valor de R\$ 92,00. Se, para pagamento à vista, você conseguir um desconto de 15 %, qual será o valor à vista deste livro?

(15) Verifique que $a = 1$ é raiz do polinômio $2x^3 + x^2 - 5x + 2$. Em seguida, encontre o polinômio $q(x)$ tal que $2x^3 + x^2 - 5x + 2 = (x-1)q(x)$.

(16) Determine o quociente $q(x)$ e o resto $r(x)$ da divisão do polinômio $6x^4 - x^3 + 3x^2 - x + 1$ pelo polinômio $2x^2 + x - 3$.

(17) Relembre o *Binômio de Newton* e o *Triângulo de Pascal*. Em seguida, determine o coeficiente do termo x^6 na expansão de $(x-1)^{10}$.

(18) Deduza a fórmula de Bháskara para a equação quadrática $ax^2 + bx + c = 0$.

Revisão: números reais, módulos e inequações

(1) Decida se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas. Justifique suas respostas!

(a) () $\sqrt{4} = \pm 2$;

(b) () $\pi = \frac{22}{7}$;

(c) () $\sqrt{x^2} = x$, para todo $x \in \mathbb{R}$;

(d) () $\sqrt{36} + \sqrt{64} = \sqrt{36+64}$;

(e) () $\sqrt{a^2 + b^2} = a + b$;

(f) () $3 < \frac{1}{x} \iff x < \frac{1}{3}$, para $x \neq 0$;

(g) () $a \leq b \implies a^2 \leq b^2$, para a, b reais quaisquer;

(h) () Sejam $a \in \mathbb{Q}$ e $b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Então $a \cdot b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$;

(i) () $|a+b| = |a| + |b|$, $\forall a, b \in \mathbb{R}$;

(j) () Se $x < y$, então $|x-y| = x-y$;

(k) () $\sqrt{a^2 b^2} = ab$;

(l) () Se $z \in \mathbb{R}$ e $x \leq y$, então $xz \leq yz$;

(m) () $a^4 = 81b^4 \implies a = 3b$;

(n) () Para $0 < a < b$, vale $0 < \sqrt{ab} < \frac{a+b}{2} < b$.

(2) Encontre o conjunto solução das seguintes desigualdades:

(a) $x^2 < 9$

(d) $x^3 > 27$

(b) $x^2 > -1$

(e) $x^2 < 6x - 5$

(c) $\frac{x-6}{x+2} \geq 0$

(f) $\frac{(x+2)(x-3)}{x(x^2+1)} < 0$.

(3) Resolva as seguintes inequações:

(a) $-5x + 2 \leq 3x + 8$

(e) $\frac{x^2 - x + 2}{x^2 + 4x} \geq 0$

(b) $(-5x + 2)(x - 2) \leq (3x + 8)(x - 2)$

(f) $\frac{x-2}{x-3} \leq x - 1$

(c) $\frac{(x-3)(x+2)}{x} < 1$

(g) $x^4 - 3x^2 + 2 > x^2 - 1$

(d) $\frac{x}{x+1} - \frac{x}{x-1} \geq 0$

(h) $(4x+7)^{18}(2x+8) < 0$.

(4) Mostre que $\sqrt{6} \notin \mathbb{Q}$. Em seguida, prove que $\sqrt{2} + \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

(5) Resolva as seguintes inequações modulares:

$$(a) |1 - 3x| < 5$$

$$(b) |x^2 + 3| > 3$$

$$(c) |x - 1| - |x + 2| \geq 5$$

$$(d) |x + 2| \cdot |x - 1| > 3$$

$$(e) |x^2 - 3x| > 2|x| + 1$$

$$(f) |2x^2 - 1| < 1$$

$$(g) 3|x - 1| + |2x - 7| < -|x - 1|$$

$$(h) |(-x)^2 - 2|x| + 2| \leq 1$$

$$(i) \left| \frac{2x+1}{x-1} \right| < \frac{1}{2}$$

$$(j) \left| 4 + \frac{1}{x} \right| < 6$$

$$(k) \frac{|x-3|}{|x-2|} \leq |x-1|.$$

Funções reais de uma variável real

$$(1) \text{ Calcule } g(0), g(2), g(\sqrt{2}) \text{ e o domínio de } g, \text{ onde } g(x) = \frac{x}{x^2 - 1}.$$

$$(2) \text{ Simplifique a expressão } \frac{f(a+b) - f(a-b)}{ab}, \text{ sendo } f(x) = x^2 \text{ e } ab \neq 0.$$

(3) Encontre o domínio das seguintes funções:

$$(a) a(x) = \sqrt{\frac{1}{x} + \frac{1}{x-1}}$$

$$(b) b(x) = \sqrt{-3 - |x+1|}$$

$$(c) c(x) = \frac{|x-2|}{|x-3| - |x-5|}$$

$$(d) d(x) = \frac{1}{x+1} - \sqrt{-x}.$$

(4) Esboce o gráfico das seguintes funções:

$$(a) f(x) = x - |x|$$

$$(d) g(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 2x + 6}{x+3}$$


$$(b) f(x) = |x - 3|$$

$$(e) g(x) = |2x + x^2|$$

$$(c) f(x) = \begin{cases} 10 - 2x, & \text{se } x > 3 \\ (x-2)^2, & \text{se } x \leq 3 \end{cases}$$

$$(f) g(x) = \frac{|x|}{x}.$$

(5) Seja f uma função cujo gráfico está esboçado na figura abaixo. A partir deste, esboce os gráficos das funções: $g(x) = |f(x)|$, $h(x) = f(|x|)$, $j(x) = f(x-1)$ e $k(x) = f(x) - 1$.



(6) Sejam $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ e $g(x) = x + 3$. Podemos dizer que $f = g$? Explique!

(7) Quais das seguintes funções são pares? E ímpares?

(a) $a(x) = (x - 1)^2$

(b) $b(x) = x|x|$

(c) $c(x) = \sqrt{3x^4 + 2x^2}$.

(8) Determine se o conjunto dado é o gráfico de uma função:

(a) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; y = x^2\}$

(c) $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x^2 + y^2 = 1\}$

(b) $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; y^2 = x\}$

(d) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x^2 + y^2 = 1 \text{ e } y \geq 0\}$.

(9) Seja $f : A \rightarrow [-8, 1[$ dada por $f(x) = \frac{3 + 2x}{2 - x}$. Determine o conjunto A .

(10) Verifique que $\text{Im}(f) \subset D_g$ e determine a composta $h(x) = g(f(x))$ nos seguintes casos:


(a) $g(x) = 3x + 1$ e $f(x) = x + 2$

(b) $f(x) = 2 + x^2$ e $g(x) = \sqrt{x}$

(c) $f(x) = x^2 + 3$ e $g(x) = \frac{x + 1}{x - 2}$.

(11) O gráfico de $y = f(x)$ é dado abaixo. Associe cada equação com o seu gráfico e dê razões para suas escolhas:

- (a) $y = f(x - 4)$
- (b) $y = f(x) + 3$
- (c) $y = f(x)/3$
- (d) $y = -f(x + 4)$
- (e) $y = 2f(x + 6)$.



(12) Determine f de modo que $g(f(x)) = x$, $\forall x \in D_f$, sendo g dada por $g(x) = \frac{x + 2}{x + 1}$.

(13) Estudos recentes indicam que a temperatura média da superfície da Terra vem aumentando continuamente. Alguns cientistas modelaram a temperatura pela função linear $T = 0,02t + 8,50$ em que T é a temperatura em graus Celsius (C) e t representa o número de anos desde 1900.


(a) Use a equação para prever a temperatura média global em 2100.

(b) Segundo este modelo, em qual ano a temperatura média global será de $15,5C$?

- (14) Encontre as funções $f \circ g$, $g \circ f$, $g \circ g$ e $f \circ f \circ f$, sendo $f(x) = 1/x$ e $g(x) = x^3 + 2x$.
- (15) Determine o valor de a para que as retas dadas sejam paralelas:
- (a) $y = ax$ e $y = 3x - 1$ (b) $2x + y = 1$ e $y = |a|x + 2$ (c) $x + ay = 0$ e $y = 3x + 2$.
- (16) Expresse a área de um triângulo equilátero em função do lado.
- (17) Seja d a distância de $(0,0)$ a (x,y) . Expresse d como função de x , sabendo que (x,y) é um ponto do gráfico de $y = \frac{1}{x}$.
- (18) Encontre uma expressão para a função cujo gráfico é o segmento de reta unindo os pontos $(-2, 1)$ e $(4, -6)$.
- (19) Obtenha a expressão da função cujo gráfico é a parte de baixo da parábola $x + (y - 1)^2 = 0$.

Limites e continuidade: noções intuitiva e formal, e suas propriedades

- (1) Considere uma função f cujo gráfico é dado por:



Estime as informações pedidas:

- (a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ (c) $f(-2)$ (e) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ (g) $f(1)$ (i) $f(4)$
 (b) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ (d) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ (f) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ (h) $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ (j) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.
- (2) Explique com suas palavras o que significa $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$. Podemos concluir que $f(2) = 5$? Além disso, é possível afirmarmos que $f(2) = 3$?

(3) Explique o significado de

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 5.$$

O que você pode dizer sobre o limite de $f(x)$ quando x tende a 1?

(4) Demonstre, pela definição, os seguintes limites:

$$(a) \lim_{x \rightarrow 2} (4x - 3) = 5$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0.$$

(5) Prove que a reta é contínua, ou seja, dados $a, b \in \mathbb{R}$, a função $f(x) = ax + b$ é contínua.

(6) Seja f uma função definida em \mathbb{R} e tal que $|f(x) - 3| \leq 2|x - 1|$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Calcule $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

(7) Prove que a função modular é contínua em toda a reta, ou seja, $\lim_{x \rightarrow a} |x| = |a|$, $\forall a \in \mathbb{R}$.

(8) Calcule, se existir, o valor de $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$, sendo a função f dada por

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & \text{se } x \geq 1 \\ x^2, & \text{se } x < 1 \end{cases}.$$

Em seguida, esboce o gráfico de f e determine o conjunto dos pontos onde f é contínua.

(9) Determine, se existir, os seguintes limites:

$$(a) \lim_{x \rightarrow -1} (-x^2 - 2x + 3)$$

$$(j) \lim_{x \rightarrow -9} (\sqrt{-x} - x - 10)$$

$$(s) \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{4x^2 - 1}{2x - 1}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{7}$$

$$(k) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x(x-2)^2|}{x^2 - 4x + 4}$$

$$(t) \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2-t} - \sqrt{2}}{t}$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5}{x-1}$$

$$(l) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x-1} + \frac{3}{1-x^3} \right)$$

$$(u) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[4]{x} - \sqrt[4]{2}}{x-2}$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x-9}{x-3}$$

$$(m) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + \sqrt{x} - 2}{x^3 - 1}$$

$$(v) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{2}}{x-2}$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-4}{\sqrt{x} - \sqrt{2}}$$

$$(n) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{|x-1|}$$

$$(w) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - x^2}{1 - \sqrt{x}}$$

$$(f) \lim_{a \rightarrow -2} \sqrt{a(a-1)}$$

$$(o) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(4+h)^2 - 16}{h}$$

$$(x) \lim_{x \rightarrow 2} \left| \frac{x^2 - 4}{2-x} \right|$$

$$(g) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{x^2 + 16} - 5}{x^2 + 3x}$$

$$(p) \lim_{x \rightarrow 9} \frac{x\sqrt{x}}{x^2 - 1}$$

$$(y) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{(x-3)^2}}{x-3}$$

$$(h) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - x^3 - x^2 + 1}{x^2 + x - 2}$$

$$(q) \lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{7}}{\sqrt{x+7} - \sqrt{14}}$$

$$(z) \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{1}{t\sqrt{1+t}} - \frac{1}{t} \right].$$

$$(i) \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|x-1|}{x-1}$$

$$(r) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+3x} - \sqrt{x+2}}{x+3x^2}$$

(10) Qual é o valor de $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt[3]{x} + 1}{(x-1)^2}$?

(11) Obtenha o conjunto dos pontos de continuidade das seguintes funções:

$$(a) f(x) = \begin{cases} 2x, & \text{se } x \leq 1 \\ 1, & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

$$(b) g(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x < 0 \\ x^2, & \text{se } 0 \leq x \leq 2 \\ 8-x, & \text{se } x > 2 \end{cases}$$

(12) Verifique se $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ tal que a função seja contínua no ponto p :

$$(a) \quad f(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x}, & \text{se } x \neq 0 \\ \lambda, & \text{se } x = 0 \end{cases}, \quad p = 0 \quad (b) \quad f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 8}{x - 2}, & \text{se } x \neq 2 \\ \lambda, & \text{se } x = 2 \end{cases}, \quad p = 2.$$

(13) Dê exemplo de uma função definida em \mathbb{R} e que seja contínua em $\mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}$.

(14) Existe um número $a \in \mathbb{R}$ tal que $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x^2 + ax + a + 3}{x^2 + x - 2}$ existe? Caso afirmativo, encontre a e o valor do limite.

(15) Considere a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1}, & \text{se } x \neq 1 \\ 0, & \text{se } x = 1 \end{cases}.$$

Verifique que $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$. Pergunta-se: f é contínua em $x = 1$? Por que?

(16) Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função satisfazendo $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$.

(a) Calcule o valor de $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$;

(b) O seguinte cálculo está correto? Justifique!

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \cdot f(x)}{x} = 3 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 3 \cdot 1 = 3.$$

(c) Mostre que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x)}{x} = 3$.

(17) Seja f uma função que satisfaz $-x^2 + 3x \leq f(x) \leq \frac{x^2 - 1}{x - 1}$, $\forall x \neq 1$. Calcule $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

(18) Suponha que $|f(x) - f(1)| \leq \sqrt{2}(x - 1)^2$, para todo x suficientemente próximo de 1. Mostre que f é contínua em $x = 1$.

(19) Decida se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas, justificando ou apresentando um contra-exemplo:

(a) Se o limite de f em x_0 existe, então f está definida em x_0 ;

(b) Se f é descontínua em x_0 , então os limites laterais de f em x_0 são infinitos;

(c) Se f é contínua, então $|f|$ é contínua;

(d) Se $|f|$ é contínua, então f é contínua;

(e) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \implies f$ é contínua em a .

(20) Determine constantes A e B reais de modo que a função abaixo seja contínua em \mathbb{R} :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2}, & \text{se } x < 2 \\ Ax^2 - Bx + 3, & \text{se } 2 \leq x < 3 \\ 2x - A + B, & \text{se } x \geq 3 \end{cases}.$$

(21) Dados $a, b, c \in \mathbb{R}$ fixos, suponha que vale $|a + bx + cx^2| \leq |x|^3$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Prove que $a = b = c = 0$.

(22) Na Teoria da Relatividade, a *fórmula da contração de Lorentz*

$$L(v) = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

expressa o comprimento L de um objeto como uma função de sua velocidade v em relação a um observador, onde L_0 é o comprimento do objeto em repouso e c é a velocidade da luz. Encontre $\lim_{v \rightarrow c^-} L(v)$ e interprete o resultado (em termos físicos). Por que é necessário o limite à esquerda?

(23) **Desafio:** Seja $f(x) = x^3 - 2$.

(a) Encontre um número real $\delta > 0$ tal que, se

$$0 < |x - 2| < \delta, \text{ então } |f(x) - 6| < \epsilon, \text{ com } \epsilon = 1.$$

(b) Repita o exercício anterior com $\epsilon = 0,1$ e $\epsilon = 0,01$;

(c) Encontre um $\delta > 0$ para um $\epsilon > 0$ arbitrário, e conclua que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 6$.

Limites trigonométricos e o 1º limite fundamental

(1) Utilize as igualdades

$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \sin y \cos x$ e $\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$, válidas para todos $x, y \in \mathbb{R}$, para mostrar as seguintes identidades trigonométricas:

(a) $\sin(x - y) = \sin x \cos y - \sin y \cos x$

(b) $\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$

(c) $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$

(d) $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$

(e) $\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$

(f) $\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$.

(2) Verifique que, para todo $x \in \mathbb{R}$ com $\cos x \neq 0$, tem-se $\sec^2 x = 1 + \operatorname{tg}^2 x$.

(3) Determine o domínio e esboce o gráfico das funções cotangente e cossecante.

(4) Dados $a, b \in \mathbb{R}$, verifique que $\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)]$. Utilize esse resultado para provar que a função cosseno é contínua.

(5) Prove, pela definição, que $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$.

(6) Calcule, se existir, o valor dos seguintes limites:

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x}$	(f) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \cos x \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^{-1}$	(j) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{2x - \pi}$
(b) $\lim_{x \rightarrow 0} x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x}\right)$	(g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x}$	(k) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(3x)}{\operatorname{sen}(4x)}$
(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{\operatorname{sen} x}$	(h) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x}\right)}{\operatorname{sen} x}$	(l) $\lim_{x \rightarrow p} \frac{\operatorname{sen}(x^2 - p^2)}{x - p}$
(d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x^2)}{x^2}$	(i) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\operatorname{sen} x}{x - \pi}$	(m) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\operatorname{sen}(\pi x)}{x - 1}.$
(e) $\lim_{x \rightarrow 0} x \operatorname{cossec} x$		

Limites no infinito e limites infinitos

(1) Explique o significado dos seguintes limites:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1.$$

(2) Calcule o valor dos seguintes limites:

(α) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 - x^2 + 7x - 3}{2 - x + 5x^2 - 4x^3}$	(ν) $\lim_{x \rightarrow \infty} [x^4 - 3x + 2]$
(β) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x})$	(ξ) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{9x+1}}$
(γ) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{x+1}}$	(ο) $\lim_{u \rightarrow 1} \frac{1}{u^2 - 3u + 2}$
(δ) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 2x^2}{x^2 - 4x + 4}$	(π) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x+7} - 2}{x - 1}$
(ε) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 2x + 1}{x^3 + 1}$	(ρ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} [5 - 4x + x^2 - x^5]$
(ζ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + 1}{x + 3}$	(σ) $\lim_{x \rightarrow \infty} (x - \sqrt{x^2 + 3x})$
(η) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[5 + \frac{1}{x} + \frac{3}{x^2} \right]$	(τ) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x}$
(θ) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[3]{5 + \frac{2}{x}}$	(υ) $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{5}{3 - x}$
(ι) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[3]{\frac{x}{x^2 + 3}}$	(φ) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3}{x^2 - x}$
(κ) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{3x + 2}$	(χ) $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2 - 3x}{x^2 - 6x + 9}$
(λ) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{x^3 + 2x - 1}}{\sqrt{x^2 + x + 1}}$	(ψ) $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{2x + 1}{x^2 + x}$
(μ) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}{x^2 + 3}$	(ω) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\operatorname{sen} x}{x^3 - x^2}.$

(3) **Desafio:** Calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x + \sqrt{x}} - \sqrt{x - 1} \right).$

(4) Prove que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$, onde $n > 0$ é um natural.

(5) Na Teoria da Relatividade, a massa m de uma partícula com velocidade v é dada por

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}},$$

onde m_0 é a massa da partícula em repouso ($v = 0$) e c é a velocidade da luz ($c \approx 300.000 \text{ km/s}$). O que acontece quando $v \rightarrow c^-$? Por que é necessário o limite à esquerda?

(6) Calcule os seguintes limites:

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 1}{\sin x} \quad (b) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{3x - 11}{|x| - 3} \quad (c) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x + |x|}{7x - 5|x|}.$$

(7) Dê exemplos de funções f e g tais que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 0} (f(x) - g(x)) = 1.$$

(8) Dada a função $f(x) = \frac{-5x^2 + 50x + 375}{x^2 - 20x + 75}$, faça o que se pede:

(a) Calcule $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$;

(b) Determine onde f intercepta os eixos x e y ;

(c) Com base nessas informações, tente esboçar o gráfico de f .

(9) Use limites para provar que as seguintes desigualdades são válidas:

(a) $\frac{x^2 + 1}{(1-x)^2} > 3700$ para todo x suficientemente próximo de 1 (exceto $x = 1$);

(b) $1,95 < \frac{2x + 75}{x} < 2,1$ para todo x suficientemente grande.

(10) A força gravitacional exercida pela Terra sobre uma unidade de massa à uma distância r do centro do planeta Terra é dada por

$$F(r) = \begin{cases} GMrR^{-3}, & \text{se } r < R \\ \frac{GM}{r^2}, & \text{se } r \geq R \end{cases},$$

onde M é a massa da Terra, R é seu raio e G é a constante gravitacional ($G \approx 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$).

(a) Qual é o domínio de F ? Podemos dizer que F é uma função contínua de r ?

(b) Calcule $\lim_{r \rightarrow \infty} F(r)$ e interprete seu significado físico.

Limites logarítmicos e exponenciais, e o T.V.I.

(1) Determine o domínio, a imagem e esboce o gráfico das seguintes funções:

$$\begin{array}{lll} (a) \quad a(x) = 7^x & (c) \quad c(x) = \log_3(x) & (e) \quad e(x) = |\ln x| \\ (b) \quad b(x) = (0, 2017)^x & (d) \quad d(x) = \ln|x| & (f) \quad f(x) = |\ln|x||. \end{array}$$

- (2) A função $f(x) = x^5 + x + 1$ possui alguma raiz real?
- (3) Mostre que a equação $\sin x + 2 \cos x = x^2$ possui solução no intervalo $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
- (4) Utilize o T.V.I. para mostrar que:
- o polinômio $p(x) = x^4 - 3x^3 + 4$ tem alguma raiz real no intervalo $[1, 2]$;
 - a equação $2^x + 3 = 4x$ tem pelo menos duas soluções reais.
- (5) Prove que todo polinômio de grau ímpar tem pelo menos uma raiz real.
- (6) As funções seno e cosseno hiperbólicos são definidos por $\operatorname{senh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ e $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, respectivamente. Calcule o limite dessas funções para $x \rightarrow \pm\infty$ e esboce o gráfico das mesmas.
- (7) Determine onde as funções abaixo são contínuas:
- | | |
|--|----------------------------------|
| (a) $a(x) = \ln(x^2 - x - 6)$ | (c) $c(x) = \frac{x^3}{\ln x }$ |
| (b) $b(x) = \frac{\sqrt[4]{x+5}}{1-e^x}$ | (d) $d(x) = \sqrt{2-\sqrt{x}}$. |
- (8) Após um objeto ser retirado do forno, sua temperatura T (em C) variou ao longo do tempo t (em min) de acordo com a lei $T(t) = 28 + 52e^{-\frac{t}{15}}$. Ache a temperatura inicial do objeto e para qual valor ela converge após um tempo suficientemente longo.
- (9) Aplique a definição para provar que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_2 x = +\infty$.
- (10) Calcule os seguintes limites, caso existam:
- | | |
|---|--|
| (a) $\lim_{x \rightarrow \infty} [2^x - 3^x]$ | (j) $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{1-2x}$ |
| (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1-2^x}{1-3^x}$ | (k) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5^x - 1}{x}$ |
| (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln\left(\frac{x}{x+1}\right)$ | (l) $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{1/x} \ln(x)$ |
| (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} [\ln(2x+1) - \ln(x+3)]$ | (m) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^{3x}-1}{x}$ |
| (e) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{4}{x}\right)^x$ | (n) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2^{\frac{1}{x}}}{1+2^{\frac{5}{x}}}$ |
| (f) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^x$ | (o) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 + \ln x)$ |
| (g) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^{3x}$ | (p) $\lim_{x \rightarrow 2^-} \ln(2-x)$ |
| (h) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3}{x}\right)^{2x}$ | (q) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-4}{x-1}\right)^{x+3}$ |
| (i) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x+2}{x+1}\right)^x$ | (r) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+1}{x^2-3}\right)^{x^2}$. |
- (11) Mostre que, $\forall x \geq 1$, vale a igualdade $\ln\left(\frac{x+\sqrt{x^2-1}}{x-\sqrt{x^2-1}}\right) = 2 \ln\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)$.

- (12) Para calcular o limite $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{(x^2-1)} - 1}{x - 1}$, um aluno fez a seguinte mudança de variável:

$$h = x^2 - 1 \iff x^2 = h + 1 \iff x = \pm\sqrt{h + 1}.$$

Qual dessas duas possibilidades de x ele deve considerar? Em outras palavras, qual dos limites abaixo está correto:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{(x^2-1)} - 1}{x - 1} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{\sqrt{h+1} - 1} \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{(x^2-1)} - 1}{x - 1} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{-\sqrt{h+1} - 1} ?$$

Explique e calcule o valor do respectivo limite.

- (13) Aplique o teorema do confronto (ou sanduíche) para calcular os seguintes limites:

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \cos(\ln x) \qquad (b) \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} e^{\sin(\frac{\pi}{x})} \qquad (c) \lim_{x \rightarrow +\infty} (2 + \cos x)^{\frac{1}{x}}.$$

- (14) Mostre que existe um número $\lambda > \frac{1}{2}$ que satisfaz a equação $\lambda^\lambda = \cos \lambda$.

- (15) **Desafio:** Utilize o teorema do confronto para avaliar o seguinte limite:


$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin x}{x} + \frac{x^2}{e^{\sin(\frac{1}{x})} + 1} \right].$$

- (16) O *método da exaustão*, considerado como o precursor dos métodos de cálculo, é um método para se encontrar a área de uma figura inscrevendo-se dentro dela uma sequência de polígonos cuja soma das áreas converge para a área da figura desejada. Arquimedes usou tal método para calcular uma aproximação de π , preenchendo o círculo com polígonos de um número cada vez maior de lados. Para exemplificar esse método, faça o seguinte:

- (a) Seja A_n a área de um polígono com n lados iguais inscrito em um círculo de raio r . Dividindo o polígono em n triângulos congruentes com ângulo central $\frac{2\pi}{n}$, mostre que

$$A_n = \frac{1}{2} n r^2 \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right).$$

- (b) Verifique que $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \pi r^2$ e interprete!



GABARITO

Matemática básica

- (1) Média aritmética = 44, $m.m.c.(36, 40, 56) = 2520$ e $m.d.c.(36, 40, 56) = 4$; (2) 2^{2025} ;
- (3) (a) F , (b) V , (c) V , (d) F , (e) V , (f) V , (g) F , (h) F , (i) F ;
- (4) (a) 0,04, (b) $3 \cdot 10^{-2}$, (c) $\frac{13}{4}$, (d) $\sqrt{2}$, (e) $-a^{-7/9}$, (f) 10, (g) 2, (h) $-4xy$, (i) $\frac{65}{4}$, (j) $\frac{103}{16}$, (k) $\frac{8}{5}$; (5) (a) $x = -3$, (b) $x = \frac{28}{15}$, (c) $x = 5$, (d) $x = -1$, (e) $\frac{2}{3}$, (f) -4, (g) $x \in \left\{-1, \frac{3}{4}\right\}$, (h) $-\frac{4}{3}$; (6) (a) $x \in \left\{-1, \frac{5}{2}\right\}$, (b) $x \in \{-1, 1, 2\}$, (c) $x = \pm 2$, (d) $x = 24$; (8) (a) $x = 1$, $y = -1$, (b) $x = y = \frac{1}{4}$; (9) (a) ab , (b) $\left(\frac{a+b}{a-b}\right)^2$ e (c) 3; (11) 3; (12) (a) $x \in \{2, 3\}$, (b) 9; (13) 4;
- (14) R\$ 78,20; (15) $q(x) = 2x^2 + 3x - 2$; (16) $q(x) = 3x^2 - 2x + 7$ e $r(x) = -14x + 22$; (17) 210.

Revisão: números reais, módulos e inequações

- (1) A única alternativa verdadeira é a letra (n). Para ver isso, note que $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = a + b - 2\sqrt{ab}$.

(3) Denotando por \mathcal{S} o conjunto solução das inequações, temos:

- | | |
|---|---|
| (a) $\mathcal{S} = \left[-\frac{3}{4}, +\infty\right)$
(b) $\mathcal{S} = \left(-\infty, -\frac{3}{4}\right] \cup [2, +\infty)$
(c) $\mathcal{S} = \left(-\infty, 1 - \sqrt{7}\right) \cup \left(0, 1 + \sqrt{7}\right)$
(d) $\mathcal{S} = (-\infty, -1) \cup [0, 1)$ | (e) $\mathcal{S} = (-\infty, -4) \cup (0, +\infty)$
(f) $\mathcal{S} = \left[\frac{5 - \sqrt{5}}{2}, 3\right) \cup \left[\frac{5 + \sqrt{5}}{2}, +\infty\right)$
(g) $\mathcal{S} = \left(-\infty, -\sqrt{3}\right) \cup (-1, 1) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$
(h) $\mathcal{S} = (-\infty, -4)$. |
|---|---|

- (4) *Dica:* Após provar, por absurdo, que $\sqrt{6} \notin \mathbb{Q}$, use este fato para demonstrar que $\sqrt{2} + \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.


(5) Denotando por \mathcal{S} o conjunto solução das inequações modulares, temos:

- | | |
|---|--|
| (c) $\mathcal{S} = \emptyset$
(d) $\mathcal{S} = \left(-\infty, -\frac{1 + \sqrt{21}}{2}\right) \cup \left(\frac{-1 + \sqrt{21}}{2}, +\infty\right)$
(e) $\mathcal{S} = \left(-\infty, \frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right) \cup \left(\frac{5 + \sqrt{29}}{2}, +\infty\right)$
(f) $\mathcal{S} = (-1, 0) \cup (0, 1)$ | (g) $\mathcal{S} = \emptyset$
(h) $\mathcal{S} = \{-1, 1\}$
(i) $\mathcal{S} = \left(-1, -\frac{1}{5}\right)$
(j) $\mathcal{S} = \left(-\infty, -\frac{1}{10}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$
(k) $\mathcal{S} = (-\infty, 2) \cup [1 + \sqrt{2}, +\infty)$. |
|---|--|

Funções reais de uma variável real

- (2) 4; (3) (a) $\left(0, \frac{1}{2}\right] \cup (1, +\infty)$, (b) \emptyset , (c) $\mathbb{R} \setminus \{4\}$ e (d) $(-\infty, 0] \setminus \{-1\}$.

(5)

(6) Não, pois $D_f \neq D_g$; (7) (a) Não é par nem ímpar, (b) Ímpar, (c) Par; (8) (a) É gráfico de função.

(b) Não é gráfico de função, (c) Não é gráfico de função, (d) É gráfico de função;

(9) $A = \left(-\infty, -\frac{1}{3}\right) \cup \left[\frac{19}{6}, \infty\right)$; (10) (a) $h(x) = 3x + 7$, (b) $h(x) = \sqrt{2+x^2}$, (c) $h(x) = \frac{x^2+4}{x^2+1}$;

(12) $f(x) = \frac{x-2}{1-x}$; (13) (b) 2250; (15) (a) 3, (c) $-\frac{1}{3}$; (16) $A(l) = \frac{\sqrt{3}}{4}l^2$; (17) $d = \frac{\sqrt{x^4+1}}{|x|}$.

Limites e continuidade: noções intuitiva e formal, e suas propriedades


(1) (a) 3, (b) 3, (c) 5, (d) 1, (e) -1, (f) não existe, (g) -1, (h) ∞ , (i) não existe, (j) 0;(6) 3; (7) Utilize a desigualdade $||a| - |b|| \leq |a - b|$, que é válida para todos $a, b \in \mathbb{R}$;(8) O limite não existe e a função f é contínua no conjunto \mathbb{R} ;

- (9) (a) 4, (b) $\sqrt{7}$, (c) -5, (d) 3, (e) 0, (f) $\sqrt{6}$, (g) $\frac{1}{5}$, (h) $-\frac{1}{3}$, (i) -1, (j) 2, (k) 2, (l) 1, (m) $\frac{1}{2}$, (n) $\frac{27}{80}$, (o) 8, (p) $\frac{27}{80}$, (q) $\sqrt{2}$, (r) $\frac{\sqrt{2}}{2}$, (s) 2, (t) $-\frac{1}{2\sqrt{2}}$, (u) $\frac{1}{4\sqrt[4]{8}}$, (v) $-\frac{1}{4}$, (w) 3, (x) 4, (y) $\frac{27}{80}$, (z) $-\frac{1}{2}$; (11) (a) $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, (b) $\mathbb{R} \setminus \{2\}$; (12) (a) Não existe $\lambda \in \mathbb{R}$, (b) $\lambda = 12$;

(14) $a = 15$ e o limite vale -1; (15) Não é contínua em $x = 1$; (16) (a) 0, (b) Não; (17) 2;(19) A única alternativa verdadeira é a letra (c); (20) $A = B = \frac{1}{2}$; (23) (a) $\delta = \min \left\{ 2 - \sqrt[3]{7}, \sqrt[3]{9} - 2 \right\}$.

Limites trigonométricos e o 1º limite fundamental

(3)



- (6) (a) 3, (b) 0, (c) 1, (d) 0, (e) 1, (f) -1, (g) 1, (h) 0, (i) -1, (j) 0, (k) $\frac{3}{4}$, (l) $2p$, (m) $-\pi$.

Limites no infinito e limites infinitos

- (2) (α) $-\frac{1}{2}$, (β) 0, (γ) ∞ , (δ) ∞ , (ϵ) 0, (ζ) 2, (η) 5, (θ) $\sqrt[3]{5}$, (ι) 0, (κ) $\frac{1}{3}$, (λ) 1, (μ) 0, (ν) ∞ , (ξ) $\frac{1}{3}$, (σ) não existe, (π) $\frac{1}{12}$, (ρ) ∞ , (σ) $-\frac{3}{2}$, (τ) 0, (v) $-\infty$, (ϕ) $+\infty$, (χ) $+\infty$, (ψ) ∞ , (ω) $-\infty$; (3) $\frac{1}{2}$, (5) A massa se torna arbitrariamente grande; (6) (a) Não existe, (b) Não existe, (c) $\frac{1}{6}$; (8) (a) Ambos são -5 , (b) Nos pontos $(-5, 0)$ e $(0, 5)$; (c) Ver o gráfico abaixo e note que há um buraco em $x = 15$:



- (9) (a) Mostre que $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 1}{(1-x)^2} = +\infty$ e aplique a definição, (b) Mostre que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 75}{x} = 2$ e aplique a definição.

Limites logarítmicos e exponenciais, e o T.V.I.

- (2) Note que $f(0) > 0$ e $f(-1) < 0$;
 (4) (b) Fazendo $f(x) = 2^x + 3 - 4x$, observe que $f(1) > 0$, $f(2) < 0$ e $f(4) > 0$;
 (7) (a) $(-\infty, -2) \cup (3, +\infty)$, (b) $\{x \in \mathbb{R} ; x \geq -5 \text{ e } x \neq 0\}$, (c) $\{x \in \mathbb{R} ; x \neq 0 \text{ e } x \neq \pm 1\}$, (d) $[0, 4]$;
 (8) $T(0) = 80C$ e $28C$;
 (9) Note que $\log_2 x > \epsilon = \log_2 (2^\epsilon)$ e utilize que a função $f(x) = \log_2 x$ é crescente;
 (10) (a) $-\infty$, (b) 0, (c) 0, (d) $\ln(2)$, (e) e^4 , (f) ∞ , (g) e^6 , (h) e^{-6} , (i) e , (j) e^{-2} , (k) $\ln(5)$, (l) $-\infty$, (m) $3\ln(2)$, (n) $\frac{1}{2}$, (o) $-\infty$, (p) $-\infty$, (q) e^{-3} , (r) e^4 ; (12) 2; (13) (a) 0, (b) 0, (c) 1;
 (15) 1; (16) (a) Considere o triângulo isósceles de lado r e base como sendo um lado do polígono.